

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Y GRATUITA DE 2025

SALUD DE LOS NIÑOS

Atención de recién nacidos y hasta los 18 años

Puede llevar un seguimiento de los servicios completando la columna “Fecha en que se recibió”. ¿Tiene más de un hijo? [Haga clic aquí](#) para obtener copias adicionales.

Visitas de control del niño sano

Los bebés deben ver al médico o al personal de enfermería 6 veces antes del primer cumpleaños. La primera visita del bebé sano es entre los 3 y 5 días posteriores al alta hospitalaria. Después de esa primera visita, el cronograma para las visitas de control del niño sano es el siguiente:

Edad	Recomendación	Fecha en que se recibió
Recién nacido	1 visita entre 3 y 5 días después del alta	
0-2 años	1 visita a los 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 y 24 meses	
2 1/2 años (30 meses)	1 visita a los 30 meses	
3-21 años	1 visita por año	

Vacunas

Las dosis, las edades y las recomendaciones varían. [Haga clic aquí](#) para ir al Calendario de vacunación recomendado para niños y adolescentes de 18 años o menos de 2025.

Vacuna	Recomendación	Fecha en que se recibió
Varicela	Primera dosis entre los 12 y 15 meses. Segunda dosis entre los 4 y 6 años. Los niños de 7 a 18 años sin pruebas de vacunación deben someterse a una serie de dos dosis: <ul style="list-style-type: none">• De 7 a 12 años, intervalo de rutina: 3 meses• De 13 años en adelante, intervalo de rutina: de 4 a 8 semanas	
COVID-19	Para conocer las últimas recomendaciones sobre la vacunación contra el COVID-19, visite: cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/COVID-19-immunization-schedule-ages-6months-older.pdf	

Vacunas (continuación)

Las dosis, las edades y las recomendaciones varían. [Haga clic aquí](#) para ir al Calendario de vacunación recomendado para niños y adolescentes de 18 años o menos de 2025.

Vacuna	Recomendación	Fecha en que se recibió
Difteria, tétanos y tos convulsa (tos ferina)	Serie de 5 dosis (serie primaria de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses y, luego, una dosis de refuerzo entre los 15 y los 18 meses y entre los 4 y los 6 años).	
Gripe (influenza)	2 dosis con un intervalo de 4 semanas, para niños de entre 6 meses y 8 años la primera vez que reciben la vacuna. 1 dosis al año para todas las personas de los 9 años en adelante.	
Haemophilus influenzae tipo B	Serie de 4 dosis (serie primaria de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses y, luego, una dosis de refuerzo entre los 12 y los 15 meses).	
Hepatitis A	Serie de dos dosis con 6 meses de diferencia; la primera tiene lugar entre los 12 y los 23 meses. Los niños que no se hayan vacunado anteriormente hasta los 18 años deben completar una serie de 2 dosis con 6 meses de diferencia.	
Hepatitis B	1 dosis para todos los recién nacidos antes del alta hospitalaria; una segunda dosis entre 1 y 2 meses y una tercera dosis entre los 6 y los 18 meses.	
HPV (virus del papiloma humano)	<p>Se recomienda la vacunación contra el HPV de rutina a los 11 – 12 años (puede comenzar a los 9 años) y se recomienda la vacunación contra el HPV para ponerse al día para todas las personas hasta los 18 años si no fueron vacunadas correctamente Serie de 2 o 3 dosis según la edad de la vacunación inicial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vacunación inicial entre los 9 y 14 años: Serie de 2 dosis a los 0 y 6 a 12 meses • Vacunación inicial a partir de los 15 años: Serie de 3 dosis a los 0, 1 o 2 y 6 meses 	
Polio	Serie de cuatro dosis a los 2 meses, 4 meses, entre los 6 y los 18 meses, y los 4 y los 6 años; la última dosis se debe administrar a partir de los 4 años y, al menos, 6 meses después de la dosis anterior.	
Sarampión, paperas, rubéola (MMR)	Serie de dos dosis: entre los 12 y los 15 meses, y entre los 4 y los 6 años.	
Meningitis meningocócica (MenACWY)	<p>Vacunación de rutina Serie de dos dosis: entre los 11 y 12 años, y a los 16 años.</p> <p>Vacunación para ponerse al día</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personas de entre 13 y 15 años: una dosis ahora y una de refuerzo entre los 16 y los 18 años. • Personas de entre 16 y 18 años: 1 dosis 	

Vacunas (continuación)

Las dosis, las edades y las recomendaciones varían. [Haga clic aquí](#) para ir al Calendario de vacunación recomendado para niños y adolescentes de 18 años o menos de 2025.

Vacuna	Recomendación	Fecha en que se recibió
Neumonía (antineumocócica)	<ul style="list-style-type: none"> Serie de 4 dosis a los 2, 4 y 6 meses y entre los 12 y 15 meses. Una dosis para niños sanos de entre 2 y 4 años que no hayan completado la serie. 	
Vacuna contra el meningococo del serogrupo B	Adolescentes de 16 años que no corren mayor riesgo; entre los 16 y los 23 años (preferentemente entre 16 y los 18 años), según las decisiones clínicas compartidas.	
Vacuna contra la viruela símica (Mpox)	Personas de 18 años y aquellas con riesgo de infección por Mpox: serie de dos dosis con 28 días de diferencia.	
Virus sincicial respiratorio (VSR)	<p>Una dosis para todos los lactantes de 8 meses o menos nacidos durante la temporada del VSR o que ingresen en ella (del otoño a la primavera).</p> <p>Una dosis para todos los niños de 8 a 19 meses que tienen un mayor riesgo de la enfermedad del VSR y que ingresan en su segunda temporada del virus.</p>	
Rotavirus	Rotarix: Serie de dos dosis a los 2 y 4 meses. RotaTeq: Serie de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses.	
Tétano, difteria y tos ferina (Tdap)	Personas de entre 11 y 12 años: Una dosis de Tdap (refuerzo para adolescentes).	

Medicamentos

Se requiere receta médica.

Medicamentos recetados	Recomendación	Fecha en que se recibió
Suplementos de fluoruro oral	<p>A partir de los 6 meses para niños cuya principal fuente de agua no contenga fluoruro.</p> <p>Para los miembros de Medicaid, la cobertura de farmacia es provista por NYRx, el Programa de Farmacia de Medicaid del Estado de Nueva York.</p>	

Visitas al médico y pruebas

Evaluaciones, pruebas de detección y asesoramiento	Recomendación	Fecha en que se recibió
Prueba de detección de ansiedad en niños y adolescentes	Entre los 8 y los 18 años.	
Orientación previsora	Todas las visitas de control del niño sano.	

Visitas al médico y pruebas (continuación)

Evaluaciones, pruebas de detección y asesoramiento	Recomendación	Fecha en que se recibió
Prueba de detección de autismo	A los 18 y 24 meses.	
Evaluación conductual, social y emocional	Desde recién nacido hasta los 21 años.	
Pruebas de detección de la concentración de bilirrubina	Para los recién nacidos.	
Presión arterial	Evaluación de riesgos que se realiza desde recién nacido hasta los 30 meses, a partir de la que se tomarán las medidas adecuadas; si el resultado es positivo, se realizarán pruebas de detección entre los 3 y los 21 años.	
Prueba de detección de cardiopatías congénitas críticas	Una vez, al momento del nacimiento.	
Prueba de detección de depresión y riesgo de suicidio en niños y adolescentes	Prueba de detección del trastorno depresivo mayor en adolescentes de 12 a 18 años.	
Prueba de detección del desarrollo	Evaluaciones de desarrollo a los 9, 18 y 30 meses (la evaluación de los 30 meses se puede realizar a los 24 meses si surge la necesidad clínica).	
Prueba de detección de dislipidemia	Recomendada a los 24 meses y a los 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 años.	
Medicamento preventivo de la gonorrea	Se debe realizar en recién nacidos para prevenir la oftalmía gonocócica neonatal.	
Prueba de detección de pérdida de la audición	Recomendada en las siguientes edades: Recién nacido; entre los 3 y 5 días y los 2 meses; 4 años; 5 años; 6 años; 8 años; 10 años; una vez entre los 11 y los 14 años; una vez entre los 15 años y los 17 años, y una vez entre los 18 y los 21 años. También se recomienda para las personas que hayan obtenido un resultado positivo en la evaluación de riesgo.	
Largo/estatura, peso, índice de masa corporal y circunferencia de la cabeza	Largo/estatura y peso: Desde recién nacido hasta los 21 años. Índice de masa corporal: de los 24 meses a los 21 años. Circunferencia de la cabeza: Desde recién nacido hasta los 18 meses. Peso por altura: Desde recién nacido hasta los 18 meses.	

Visitas al médico y pruebas (continuación)

Evaluaciones, pruebas de detección y asesoramiento	Recomendación	Fecha en que se recibió
Prueba de detección de hematocrito o hemoglobina (prueba de detección de anemia)	Para todos los niños. A los 12 meses.	
Prueba de detección de hepatitis B	Prueba de detección entre los 0 y los 21 años (realizar evaluación de riesgo de infección por el virus de la hepatitis B [VHB]).	
Prueba de detección de hepatitis C	Entre los 18 y 79 años.	
Prueba de detección de VIH	Se realizan pruebas de detección todos los años a todos los adultos mayores de 18 años. También se recomienda en cualquier momento entre los 11 y los 14 años; se realiza una evaluación de riesgos a partir de la que se tomarán las medidas adecuadas si el resultado es positivo. Despues de la evaluación inicial, los jóvenes con mayor riesgo de infección por VIH deben volver a someterse a la prueba una vez al año o con mayor frecuencia de ser necesario.	
Medicamento para la prevención del VIH para PrEP (profilaxis previa a la exposición)	Profilaxis previa a la exposición (PrEP), acompañada de una terapia antirretroviral eficaz para personas con alto riesgo de contraer VIH.	
Prueba de detección de plomo	Prueba de detección de plomo a los 12 y 24 meses.	
Examen de detección de depresión materna	Se debe realizar en las visitas de control del niño sano al mes, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses.	
Historial médico	En cada visita de niño sano.	
Panel de detección metabólica (recién nacidos)	De 0 a 90 días.	
Prueba de detección de la obesidad en niños y adolescentes	Los médicos deben evaluar la obesidad en niños y adolescentes de 6 años o más y ofrecerles o remitirlos a intervenciones conductuales intensivas e integrales para promover mejoras en el estado de peso.	

Visitas al médico y pruebas (continuación)

Evaluaciones, pruebas de detección y asesoramiento	Recomendación	Fecha en que se recibió
Prevención de caries dentales en niños menores de 5 años	Los clínicos de atención primaria deben recetar suplementos orales de fluoruro a partir de los 6 meses para niños cuyo principal suministro de agua tiene deficiencia de fluoruro. También deberían aplicar barniz de fluoruro a los dientes de leche de todos los lactantes y niños a partir de la edad de erupción de los dientes de leche.	
Prueba de detección de infecciones de transmisión sexual (STI) y asesoramiento sobre la prevención	Prueba de detección y asesoramiento sobre el comportamiento para todos los adolescentes en mayor riesgo de contraer infecciones.	
Prevención del cáncer de piel	Asesoramiento para jóvenes adultos, adolescentes, niños y padres de niños pequeños sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta (UV) en personas de 6 meses a 24 años con tipos de piel clara para reducir el riesgo de cáncer de piel.	
Evaluación del consumo de tabaco, alcohol o drogas	Personas de entre 11 y 21 años.	
Detección y asesoramiento sobre el consumo de tabaco	En cada visita a niños en edad escolar y adolescentes que no han comenzado a consumir tabaco, se realizan intervenciones, que incluyen actividades educativas o un asesoramiento breve, para prevenir el inicio del consumo de tabaco.	
Evaluación del consumo de tabaco, alcohol o drogas	Evaluación de riesgo que se realiza de los 11 a los 21 años.	
Prueba de tuberculosis (TB)	Para niños en mayor riesgo de tuberculosis.	
Prueba de detección de la vista	Examen de la vista a los 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 15 años, y cuando se indique.	